



令和4年度 子宮頸がん予防ワクチン接種を受けましょう



平成 25 年から積極的なおすすめを見合わせてきましたが、令和 3 年 11 月の国の検討部会で、ワクチンの有効性が副反応のリスクを上回ると認められ、令和 4 年度から接種をお勧めすることになりました。ご希望の方は、下記の実施医療機関で接種ができます。

16歳未満の方は保護者の署名が必要です。(※16歳以上の方は自分の署名で接種ができます)

【子宮頸がんとは】

子宮の入り口にできるがんで、20歳代～30歳代で急増し、日本では年間約10,000人の女性が発症しています。初期は自覚症状があまりないまま経過し、妊娠や出産に影響を及ぼすことがあります。

このワクチンには、子宮頸がんの原因と言われているヒトパピローマウイルス(HPV)の中でも約50～70%程度を占める16型と18型の感染を予防する効果があります。100%予防できるものではないので、接種した方も接種していない方も、子宮がん検診を受診し、予防に努めてください。

【定期接種】 三浦市民で小学6年生～高校1年生相当の女子(標準的接種年齢:中学1年生)
(平成18年4月2日～平成23年4月1日生まれの女性)


※平成18年4月2日～H20年4月1日生まれの方は、令和7年3月31日までが接種期間です

【キャッチアップ接種】 三浦市民で過去9年間の差控え時期により接種機会を逃した方
期間限定 R7.3/31まで (平成9年4月2日～平成18年4月1日生まれの女性)

【費用は無料】 全額公費助成です。※通常は3回接種で約4-5万円程度かかるものです

【接種は3回】(2種類のワクチンのどちらかを3回接種してください。ワクチンは医院によって違います)

ガーダシル (4価ワクチン) : ①初回接種 ②初回から2か月後 ③初回から6か月後の間隔で接種
サーバーリックス(2価ワクチン) : ①初回接種 ②初回から1か月後 ③初回から6か月後の間隔で接種



【実施医療機関】 予約が必要な場合があります。事前に医療機関にお問い合わせください。

| 実施医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 実施医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
|--------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------|----------|
| あさい内科クリニック | 初声町入江 76-1 | 888-2217 | 矢島内科医院 | 天神町 9-16 | 881-2467 |
| 塩崎産婦人科 | 南下浦町上宮田 2994-6 | 889-1103 | ※1 三浦市立病院 | 岬陽町 4-33 | 882-2111 |
| 徳山診療所 | 南下浦町上宮田 2785-1 | 888-5115 | 小倉医院 | 横須賀市津久井 2-17-21 | 848-0290 |
| 三浦海岸つばさクリニック | 南下浦町上宮田 3230-3 マホロパ・マイナス別館 1階 | 887-3555 | 高宮小児科 | 横須賀市根岸町 4-3-20 | 837-7300 |
| 三浦メディカルクリニック | 初声町下宮田 5-16 ペイシア三浦店 2階 | 888-0505 | ※2 横須賀市立市民病院 | 横須賀市長坂 1-3-2 | 856-3136 |

※1中学生以下のみ(三浦市立病院) ※2 高校生以上のみ(横須賀市民病院)

その他の医療機関 : 全対象者の接種が可能

【接種できない方】

- ・明らかに発熱をしている（通常37.5℃以上）
- ・重篤な急性疾患にかかっている
- ・ワクチンに含まれる成分によってアナフィラキシー様症状を起こしたことがある
- ・その他、医師が接種を受けることを不適切と判断した場合

【接種するにあたって】

- ・予診票は医療機関にあります。（1回目のみ同封いたします。2、3回目は医療機関でお受け取り下さい）
- ・当日は住所、生年月日、性別、接種回数等を確認いたします。
健康保険証、母子健康手帳等、接種したことがある方は接種済証、予診票控等をお持ちください。
- ・予診票の写しは三浦市に提出されることをあらかじめご了承ください。
- ・必ず当日お渡しする説明文を読み、ご理解・ご同意の上、お受けください。また、接種当日、保護者の同伴のない方（13歳以上の方のみ。13歳未満の方は必ず保護者が同伴してください。）は、事前に保護者が説明文を読み、同意書に署名をして接種前に医療機関へご提出ください。
- ・接種後に重いアレルギー症状や血管迷走神経反射として失神が起こることがあるので、接種後は少なくとも30分間は安静にしてください。付き添いの方は接種された方の腕を持つなどし、転倒にご注意ください。
- ・妊娠中または妊娠している可能性のある方の接種に関する有効性および安全性は確立していません。妊娠中、授乳中の方の接種については、医師にご相談ください。

【ワクチンの副反応】

かゆみ、注射部位の痛み・赤み・腫れ、胃腸症状（吐き気、嘔吐、下痢、腹痛など）、筋肉の痛み、関節の痛み、頭痛、発熱、めまい、疲労など。

頻度は不明ですが、失神・血管迷走神経反応、アナフィラキシー様症状（血管浮腫、じんましん・呼吸困難など）、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑病、急性散在脳脊髄炎等が現れることがあります。

【健康被害救済】

この接種によって引き起こされた副反応により健康被害を生じた場合には、健康被害の程度等に応じて予防接種法に基づく補償を受けることができます。

【相談窓口】

ワクチンを接種した後に気になる症状が出たときは、接種医療機関へ受診してください。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口：

神奈川県健康医療局保健医療部健康危機管理課 電話 045-210-4791

感染症・予防接種相談窓口： 電話 03-5276-9337 （厚生労働省業務委託）

【これまでに自費で接種された方】

領収書があれば、払い戻しができる「償還払い」を準備中です。

詳しくは子ども課にお問い合わせください。

【厚生労働省の情報も以下のQRコードからご覧ください】



お問合せ 三浦市保健福祉部子ども課
電話 046-882-1111（内線 335・336・337）