令和4年度

三浦市子どもの予防接種のお知らせ



三浦市 子ども課 電話 046-882-1111 内線 336 337

												9	_	300	
予防接種 実施医療機関	所在地	電話番号	ロタ	B型 肝炎	ヒブ	肺炎 球菌	四種 混合	вса	MR	水痘	日本 脳炎	二種 混合	子宮頸がん	ポリオ	
あさい内科クリニック	初声町入江76-1	888-2217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	診療時間内 【BCG・ポリオ・子宮頸がんは要予約】
飯島医院	東岡町10-1	881-5265							0	\bigcirc	0	0			診療時間内
栗原耳鼻咽喉科医院	南下浦町上宮田3113 奉仕舎ビル103	889-1133							0		0	0			診療時間内(土除く)
斉田皮フ科	南下浦町上宮田3125-1	888-3401							0	0	0	0			火のみ/9時~12時・14時30分~17時
塩崎産婦人科	南下浦町上宮田2994-6	889-1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	月·火·木·金 /9~11時·15~16時 土 /9~11時 【ポリオ·二混·子宮頸がんは要予約】
田中内科医院	栄町7-11	881-4678					0		0	0	0	0			月·火·水·金 / 午前
徳山診療所	南下浦町上宮田2785-1	888-5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	診療時間内 / 午前
にしやま小児科	三崎町六合315-1	881-3887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	金 / 14 ~15時
三浦海岸つばさクリニック	南下浦町上宮田3230-3 マホロハ・マインス・別館1階	887-3555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		診療時間内
三浦診療所	南下浦町上宮田3263-1	889-3388					0	0	0	0	0	0			月·火 / 9~11時·15~16時30分 木·土 / 9~11時
三浦メディカルクリニック	初声町下宮田5-16 ベイシア三浦店2階	888-0505							△ 2期		△ 2期 特例	0	0		内科診療時間内 ※MRは2期のみ 日本脳炎は2期・特例のみ
みなみ湘南医院	南下浦町上宮田1528-102	889-1211					0		0	0	0	0			月·火·水·木·土 /診療時間内
矢島内科医院	天神町9-16	881-2467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	診療時間内
三浦市立病院	岬陽町4-33	882-2111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	月·水·金 /14:00~16:00
小倉医院	横須賀市津久井2-17-21	848-0290	0	0	\bigcirc	0	0		0	0	0	0	0	0	診療時間内(水 /休診)
げんぶん小児クリニック	横須賀市野比3-12-9	848-5578	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	診療時間内
髙宮小児科	横須賀市根岸町4-3-20	837-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	診療日 /9~12時半・15~18時 土 /9~12時半(休診日 :木·日·祝) 【ポリオ·日本脳炎·子宮頸がんは要予約】
八木医院	横須賀市ハイランド 1-22-1	848-5140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	診療時間内
横須賀市立市民病院	横須賀市長坂1-3-2	856-3136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 高校 生~	0	診療時間内(月〜金) 子宮頸がんは婦人科(高校生〜)のみ

母子健康手帳は、必ずご持参ください。(予防接種の記録証明となります) ※ 医療機関へは、お子さんの体調がよく分かる保護者の方が同伴ください。 尚、13歳以上の年齢のお子さんで、保護者の方が同伴されない場合、保護者の サインが必要です。16歳以上の方は本人の自署でOKです。 ★予防接種を受けた後に、接種局所のひどい腫れ、高熱、引きつけなどの症状が見られる場合は接種した医療機関にご相談ください。極めてまれに重い副反応が生じることもあります。このような場合、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付対象になります。



定期接種:個別接種

○基本的に個人通知はいたしませんので、対象年齢になりましたら実施医療機関で接種してください。 ○予診票は医療機関にあります。



予防接種	対象																			
少沙技性	刈水	 【初向接種盟始					乳児期						幼児期							
しず 日本 初回	2カ月~5歳に至	初回接種: 27日 日)以上おいて3回 【標準的には56日: 追加接種: 初回担	(医師が必要と認めるときは20 回	初回接種:27 日)以上おいて1 【標準的には56 追加接種:初 以上おいて1回 【標準的には13 ※初回2回目の指 ととし、それを	7 6 6 1 1 3 3 5	ワクチン ★生ワクチン △不活化ワクチン	2	3	4	5		11 12	15		2	3	4	5 6	7	٤ (
			自加接種 :初回接種に係る最後の注射終了後7 引以上おいて1回 【標準的には13月までの間隔】 ※初回2回目及び3回目の接種は、生後1歳に至る ほでに行うこととし、それを超えた場合は行わな					カ月	カ月	カ月	カ 月	カ 月 月	月月	カ月	歳	歳	歳	歳 歳	歳	意
	標準パターン 初回接種 3回	【標準的には13月 ※初回2回目及び3 までに行うことと				ヒブ (インフルエンサ・b型) ム	1	2	3			(4							
		いこと。この場合も追加接種は可能であるが、 回接種に係る最後の注射終了後、27日 (医師が 要と認めるときは20日) 以上の間隔をおいて1[うこと。	の注射終了後、27日(医師が必	の注射終了後、		小児用肺炎球菌 ム	1	2	3			(4							
2カ月〜5歳に至るまで (5歳のお誕生 日の前日まで) 標準パターン 初回接種 3回 追加接種 1回	【初回接種開始日初回接種:標準	時年齢が2カ月-7カ月未満 】 動には生後1歳までに27日以上	【初回接種開		B型肝炎(HBV) ム	1	2		3)									
	るまで (5歳のお誕生	(5歳のお誕生 な接種期間として	回 1歳から生後1歳3ヵ月を標準的 、初回接種終了後60日以上の間 って、生後1歳に至った日以降	初回接種 : 標 上の間隔種 追加接種 いた後 いただし いただらこと で が が が が が が が が が が が が が が が が が が]	四種混合 (DPT-IPV) ム		1	2	3				4						
	標準パターン において ※ただし	において1回 ※ただし、初回2回	回目及び3回目の接種は生後2歳 こととし、それを超えた場合は			二種混合(DT) △														
	追加接種 1回	行わないこと。(i 初回2回目の接種が	こことし、それを超えた場合は 自加接種は実施可能) が生後1歳を超えた場合、初回3 ないこと(追加接種は実施可能)			★				1										
予防接種	接種回数			交	種	麻しん風しん							1					2		k
ロタ	ロタ 3回(5価ワクチン) (ただし、1価ワクチンは2回)		生後6週〜32週まで (ただし、 4週間以上の間隔をあけて 【1回目の接種は生後14週6日ま									(1	2						
B型肝炎	炎 3回		生後1歳に至るまでの間 (標準的年齢:生後2カ月から生後9カ月未満 1回目終了後、139日以上			日本脳炎										1)2	3			
BCG	1回		生後1歳に至るまでの間 (1歳のお誕生日の前日まで)【標準的年齢			子宮頸がん														
四種混合			生後3カ月~7歳6カ月に至るまで 「標準的年齢:1期初回 生後3カ月~1歳			(ヒトパピローマウイルス) (HPV) ム												: R4年月 ほ・キャ:		
百日せき 破傷風 不活化ポリオ	<mark>旧せき </mark>		1期追加 初回接種終了後1			ロタウイルス ★	1	2	3											